

O Medronheiro - Da Planta ao Fruto, as práticas culturais (1^{os} resultados)

Justina Franco¹

¹Escola Superior Agrária de Coimbra, Bencanta, 3040 316 Coimbra, jfranco@esac.pt

Resumo

O medronheiro (*Arbutus unedo* L.) é uma planta de origem mediterrânica, que habitualmente vegeta sem grandes problemas consociada com algumas espécies florestais, um pouco por todo o país.

Nos últimos anos tem vindo a adquirir a importância de uma fruteira, plantada em pomares estremes com o objectivo de produção de frutos para os diversos fins. O seu comportamento, nestas condições, é ainda pouco conhecido e as práticas culturais a adoptar são por aproximação a outras espécies fruteiras e nos primeiros resultados obtidos em ensaios que estão a decorrer. Mas, ao contrário de outros frutos com curvas de crescimento de alguns meses, no medronho decorrem 12 meses desde a floração até à colheita, ficando assim expostos durante mais tempo aos diversos riscos que podem ocorrer.

As práticas culturais realizadas em qualquer pomar são fundamentais para uma boa produção quer em quantidade quer em qualidade. A conservação do solo nesta cultura é fundamental visto que, na maioria das situações, os pomares estão situados em parcelas com IQFP (índice de qualificação fisiográfica da parcela) igual ou superior a 3 com elevados riscos de erosão. A fertilização parece conduzir ao aumento da produtividade juntamente com a melhoria da qualidade. Nas plantas em formação, nos pomares para fruto fresco e em pomares instalados onde a precipitação é escassa a rega é, também, uma prática a não descurar. As plantas têm que ter uma dimensão que facilite a colheita e uma (s) forma (as) que permita (m) um bom arejamento e uma boa iluminação daí que, as podas e as empas devam ser práticas a seguir.

As práticas culturais a adoptar têm que possibilitar boas produções a baixos custos mantendo as plantas em boas condições durante um maior número de anos e preservando o meio ambiente.

Palavras-chave: curva de crescimento do fruto, conservação do solo, rega, empas, poda, colheita

Introdução

O medronheiro (*Arbutus unedo* L.) é uma espécie de origem mediterrânica muito comum a nível nacional.

Vegeta facilmente associada a espécies florestais como o pinheiro, o carvalho e o sobreiro; após a devastação pelo fogo tem capacidade de se desenvolver rapidamente.

Tradicionalmente, em algumas zonas do país, os seus frutos são utilizados para fazer aguardente; actualmente podem ter outras utilizações.

Nos últimos anos tem vindo a adquirir importância de fruteira. Na região centro já se encontram pomares estremes com alguns hectares de dimensão e as práticas